

FICHE D'INFORMATION

JOURNÉE MONDIALE DU SIDA 2014

En 2013, 35 millions [33,2 millions–37,2 millions] de personnes vivaient avec le VIH. Depuis le début de l'épidémie, environ 78 millions [71 millions–87 millions] de personnes ont été infectées par le VIH et 39 millions [35 millions–43 millions] de personnes sont décédées de maladies liées au sida.

Comblent l'écart qui nous sépare de zéro nouvelle infection à VIH

- Dans le monde, 2,1 millions [1,9 million–2,4 millions] de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2013.
- Dans le monde, 240 000 [210 000–280 000] enfants ont été nouvellement infectés par le VIH en 2013.

Comblent l'écart qui nous sépare de zéro décès lié au sida

- En 2013, 1,5 million [1,4 million–1,7 million] de personnes sont décédées de maladies liées au sida dans le monde.

Comblent l'écart en matière de traitement

- En 2013, environ 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH avaient accès à la thérapie antirétrovirale.
- Cela représente 37% [35–39%] de toutes les personnes vivant avec le VIH ; toutefois, seuls 24% [22–26%] de tous les enfants vivant avec le VIH bénéficient des médicaments salvateurs.

Réduire l'écart pour le VIH/la tuberculose

- La tuberculose reste la principale cause de décès parmi les personnes vivant avec le VIH, avec 320 000 [300 000–340 000] décès, selon les estimations, en 2012.

Comblent l'écart en matière d'accès

- Le VIH est la principale cause de décès parmi les femmes en âge de procréer.
- En 2013, 54% des femmes enceintes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire n'ont pas bénéficié d'un test VIH.
- En 2013, près de 60% de toutes les nouvelles infections à VIH parmi les jeunes de 15 à 24 ans sont survenues parmi les adolescentes et les jeunes femmes.
- En Afrique, les maladies liées au sida sont la principale cause de décès parmi les adolescents de 10 à 19 ans.
- Sur le plan mondial, les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont 19 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que la population générale.
- La prévalence du VIH parmi les professionnel(le)s du sexe est 12 fois plus élevée que parmi la population générale.
- Les femmes transgenres sont 49 fois plus susceptibles de contracter le VIH que l'ensemble des adultes en âge de procréer.
- On estime que la prévalence du VIH est jusqu'à 28 fois plus élevée parmi les personnes qui s'injectent des drogues que parmi la population générale.

STATISTIQUES MONDIALES 1990-2013

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personnes vivant avec le VIH	8,5 millions [7,4–10,3 millions]	18,7 millions [17,1–21,1 millions]	28,6 millions [26,8–30,8 millions]	32,1 millions [30,5–34,0 millions]	32,4 millions [30,8–34,3 millions]	32,7 millions [31,2–34,6 millions]	33,1 millions [31,5–34,9 millions]	33,4 millions [31,8–35,2 millions]	33,8 millions [32,2–35,6 millions]	34,2 millions [32,5–36,2 millions]	34,6 millions [32,8–36,6 millions]	35,0 millions [33,2–37,2 millions]
Nouvelles infections à VIH	1,9 million [1,7–2,2 millions]	3,4 millions [3,2–3,7 millions]	3,5 millions [3,3–3,7 millions]	2,9 millions [2,7–3,1 millions]	2,8 millions [2,6–3,0 millions]	2,7 millions [2,5–2,9 millions]	2,6 millions [2,4–2,8 millions]	2,5 millions [2,3–2,7 millions]	2,5 millions [2,3–2,7 millions]	2,4 millions [2,2–2,6 millions]	2,2 millions [2,0–2,5 millions]	2,1 millions [1,9–2,4 millions]
Décès liés au sida	350 000 [280 000–490 000]	970 000 [860 000–1,2 million]	1,8 million [1,7–2,0 millions]	2,4 millions [2,2–2,6 millions]	2,3 millions [2,1–2,5 millions]	2,2 millions [2,0–2,4 millions]	2,1 millions [1,9–2,3 millions]	2,0 millions [1,8–2,1 millions]	1,9 million [1,8–2,1 millions]	1,8 million [1,7–2,0 millions]	1,7 million [1,5–1,8 million]	1,5 million [1,4–1,7 million]
Personnes accédant au traitement								5,2 millions	7,4 millions	9,0 millions	10,6 millions	12,9 millions

Source: ONUSIDA