

## **ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ В 2014 ГОДУ**

В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 35 миллионов [33,2–37,2]. С момента начала эпидемии ВИЧ заразились примерно 78 [71–87] миллионов человек и 39 [35–43] миллионов человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

### **Сократить разрыв, чтобы свести к нулю число новых ВИЧ-инфекций**

- Во всём мире число людей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, составило 2,1 [1,9–2,4] миллиона.
- Во всём мире число детей, заразившихся ВИЧ в 2013 году, составило 240 000 [210 000–280 000].

### **Сократить разрыв, чтобы свести к нулю число смертей вследствие СПИДа**

- В 2013 году во всём мире от болезней, связанных со СПИДом, умерли 1,5 [1,4–1,7] миллиона человек.

### **Сократить разрыв в области лечения**

- В 2013 году примерно 12,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии.
- Это составляет 37% [35–39%] всех людей, живущих с ВИЧ, в то же время всего 24% [22–26%] всех детей, живущих с ВИЧ, получают жизненно важные лекарственные препараты.

### **Сократить разрыв в области ВИЧ/туберкулез**

- Туберкулез остаётся основной причиной смерти среди людей, живущих с ВИЧ: по оценкам, в 2012 году число таких смертей составило 320 000 [300 000–340 000].

### **Сократить разрыв в области доступа**

- ВИЧ является основной причиной смерти среди женщин репродуктивного возраста.
- В 2013 году 54% беременных женщин в странах с низким и средним уровнем доходов не проходили тест на ВИЧ.
- В 2013 году почти 60% всех новых ВИЧ-инфекций среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет имели место среди девушек-подростков и молодых женщин.
- Заболевания, связанные со СПИДом, являются основной причиной смертности среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет в Африке.
- Во всём мире для мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, риск быть ВИЧ-инфицированным в 19 раз выше, чем для населения в целом.
- Распространённость ВИЧ среди работников секс-бизнеса в 12 раз выше, чем среди населения в целом.
- Для трансгендерных женщин риск заразиться ВИЧ в 49 раз выше, чем для всех взрослых репродуктивного возраста.

- По оценкам, распространённость ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков в 28 раз выше, чем среди населения в целом.

## ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 1990-2013 ГГ.

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Люди, живущие с ВИЧ</b>	<b>8,5 млн.</b> [7,4-10,3 млн.]	<b>18,7 млн.</b> [17, 1-21,1 млн.]	<b>28,6 млн.</b> [26,8-30,8 млн.]	<b>32,1 млн.</b> [30,5-34,0 млн.]	<b>32,4 млн.</b> [30,8-34,3 млн.]	<b>32,7 млн.</b> [31,2-34,6 млн.]	<b>33,1 млн.</b> [31,5-34,9 млн.]	<b>33,4 млн.</b> [31,8-35,2 млн.]	<b>33,8 млн.</b> [32,2-35,6 млн.]	<b>34,2 млн.</b> [32,5-36,2 млн.]	<b>34,6 млн.</b> [32,8-36,6 млн.]	<b>35,0 млн.</b> [33,2-37,2 млн.]
<b>Новые ВИЧ-инфекции</b>	<b>19 млн.</b> [1,7-2,2 млн.]	<b>3,4 млн.</b> [3,2-3,7 млн.]	<b>3,5 млн.</b> [3,3-3,7 млн.]	<b>2,9 млн.</b> [2,7-3,1 млн.]	<b>2,8 млн.</b> [2,6-3,0 млн.]	<b>2,7 млн.</b> [2,5-2,9 млн.]	<b>2,6 млн.</b> [2,4-2,8 млн.]	<b>2,5 млн.</b> [2,3-2,7 млн.]	<b>2,5 млн.</b> [2,3-2,7 млн.]	<b>2,4 млн.</b> [2,2-2,6 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [2,0-2,5 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9-2,4 млн.]
<b>Смертность вследствие СПИДа</b>	<b>350 000</b> [280 000-490 000]	<b>970 000</b> [860 000-1,2 млн.]	<b>1,8 млн.</b> [1,7-2,0 млн.]	<b>2,4 млн.</b> [2,2-2,6 млн.]	<b>2,3 млн.</b> [2,1-2,5 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [2,0-2,4 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9-2,3 млн.]	<b>2,0 млн.</b> [1,8-2,1 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,8-2,1 млн.]	<b>1,8 млн.</b> [1,7-2,0 млн.]	<b>1,7 млн.</b> [1,5-1,8 млн.]	<b>1,5 млн.</b> [1,4-1,7 млн.]
<b>Люди, имеющие доступ к лечению</b>								<b>5,2 млн.</b>	<b>7,4 млн.</b>	<b>9,0 млн.</b>	<b>10,6 млн.</b>	<b>12,9 млн.</b>

Источник: ЮНЭЙДС