


EN BREF



Chez les 10-19 ans vivant en Afrique subsaharienne, quatre nouvelles infections au VIH sur cinq touchent des filles.

Source : estimation de l'ONUSIDA pour 2019.

Les maladies liées au sida sont la première cause de mortalité au monde chez les femmes entre 15 et 49 ans (en centaine de milliers)



Source : Global health estimates 2016: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2016. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 2018.

21X

L'INCIDENCE DU VIH EST 21 FOIS PLUS ÉLEVÉE PARMIS LES PROFESSIONNELLES DU SEXE QUE PARMIS LA POPULATION EN GÉNÉRAL

Source : ONUSIDA, 2019.


7 femmes sur 10 vivant dans une situation de conflit et appartenant à une population réfugiée sont exposées à des violences sexuelles et basées sur le genre.

Source : <https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures>.

Le risque de vivre avec le VIH est 50 % plus élevé pour les femmes victimes d'exactions.

Les femmes victimes d'abus physiques ou sexuels de la part de leur partenaire souffrent plus souvent de problèmes psychologiques, notamment de dépression et d'anxiété, leur consommation d'alcool est plus élevée et elles ont moins de contrôle sur les décisions en matière sexuelle.

Source : Jewkes, R. et al (2010). Intimate partner violence, relationship power inequity, and incidence of HIV infection in young women in South Africa: a cohort study. The Lancet 376(9734):41-48.



16 % des adolescentes et jeunes femmes mariées dans les campagnes d'Afrique subsaharienne indiquent utiliser une méthode de contraception moderne.

Source : enquêtes en population, 2011–2016. Les chiffres reposent sur les données disponibles pour 28 pays d'Afrique subsaharienne où vivent 83 % des femmes de 15 à 24 ans de la région.



23 % des adolescentes et jeunes femmes mariées dans les villes d'Afrique subsaharienne indiquent utiliser une méthode de contraception moderne.



Chez les jeunes (15–24 ans), trois nouvelles infections au VIH sur cinq touchent une jeune fille.

Source : estimation de l'ONUSIDA pour 2019.

52 %

des adolescentes et des jeunes femmes en milieu rural ne peuvent pas prendre de décisions sur leur propre santé, c'est le cas pour

47 %

d'entre elles en zone urbaine.

Source : enquêtes en population, 2011–2016. Les chiffres reposent sur les données disponibles pour 28 pays d'Afrique subsaharienne où vivent 83 % des femmes de 15 à 24 ans de la région.

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 42 % DES FEMMES ENTRE 15 ET 24 ANS VIVANT DANS UNE ZONE URBAINE SONT TOMBÉES ENCEINTES AVANT LEURS 18 ANS.

DANS LES ZONES RURALES, PLUS 50 % DES FEMMES ENTRE 15 ET 24 ANS SONT TOMBÉES ENCEINTES AVANT LEURS 18 ANS.

Source : enquêtes en population, 2011–2016. Les chiffres reposent sur les données disponibles pour 27 pays d'Afrique subsaharienne où vivent 80 % des femmes de 15 à 24 ans de la région.

Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant d'atteindre leurs 18 ans. Cette union précoce met en danger leur développement personnel et leur bien-être.

Source : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, estimations pour 2018.

ENVIRON

44

adolescentes (entre 10 et 19 ans) sont mortes tous les jours d'une maladie liée au sida en 2018.

Source : estimation de l'ONUSIDA pour 2019.